



接種方法・接種間隔

商品名	シルガード9（9価）	
1回目の接種年齢	1回目を15歳未満で接種した場合	1回目を15歳以上で接種した場合
（標準的な） 接種回数と間隔		
※標準的な接種間隔が取れない場合の対応	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2回目接種は、1回目から5か月以上の間隔をおく。（5か月以上の間隔をおかずに接種した場合は、3回接種と同じ接種間隔となります。） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2回目接種は、1回目から1か月以上の間隔をおく ・ 3回目接種は、2回目から3か月以上の間隔をおく
用法・用量	1回に0.5m l を筋肉内注射	
対応するHPVの型	6・11・16・18・31・33・45・52・58型（9価）	

* 原則、**3回（または2回）の接種は同じHPVワクチン**で行ってください。

ただし、2価または4価HPVワクチンを未完了の方が、医師とよく相談のうえで、9価HPVワクチンを接種することは可能です。

* **シルガード9（9価）の1回目を15歳未満で接種した場合、2回目**が15歳以上となった場合でも2回接種です。（接種間隔が5か月以上の場合）

※「○か月以上の間隔をおく」とは、○か月後の同じ日付から接種可能となることを意味します。○か月後に同じ日付が存在しない場合は、その翌日（翌月の1日）からとなります。

※「2か月半以上の間隔をおいて」の「●月半」とは、当該月が何日で終わるかによって以下のようになります。

28日で終わる月：14日 29日で終わる月：15日 30日で終わる月：15日 31日で終わる月：16日

例えば令和7年4月1日に接種をした場合、2月半の間隔をおいた場合、2月の間隔をおいた日である6月1日に、15日を足して6月15日が2か月半の間隔をおいた日となります。

※15歳未満：15歳の誕生日の前日

●母子手帳等で接種履歴を必ず確認してから、接種してください。